



| ワクチン                                |        | 種類   | 乳児期 |    |     |     |      |             |     |     |     | 幼児期    |                  |         |         |        | 学童期／思春期   |            |         |        |                  |                |     |         |       |  |  |
|-------------------------------------|--------|------|-----|----|-----|-----|------|-------------|-----|-----|-----|--------|------------------|---------|---------|--------|-----------|------------|---------|--------|------------------|----------------|-----|---------|-------|--|--|
|                                     |        |      | 生直後 | 6週 | 2か月 | 3か月 | 4か月  | 5か月         | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9-11か月 | 12-15か月          | 16-17か月 | 18-23か月 | 2歳     | 3歳        | 4歳         | 5歳      | 6歳     | 7歳               | 8歳             | 9歳  | 10歳以上   |       |  |  |
| B型肝炎                                | ユニバーサル | 不活化  |     |    | ①   | ②   |      |             |     |     | ③   |        | (注1)             |         |         |        |           |            |         |        |                  |                |     |         |       |  |  |
|                                     | 母子感染予防 |      | ①   | ②  |     |     |      |             | ③   |     |     |        |                  |         |         |        |           |            |         |        |                  |                |     |         |       |  |  |
| ロタウイルス                              | 1価     | 生    |     |    | ①   | ②   | (注2) |             |     |     |     |        |                  |         |         |        |           |            |         |        |                  |                |     |         |       |  |  |
|                                     | 5価     |      |     |    | ①   | ②   | ③    | (注3)        |     |     |     |        |                  |         |         |        |           |            |         |        |                  |                |     |         |       |  |  |
| 肺炎球菌（PCV13、PCV15）                   |        | 不活化  |     |    | ①   | ②   | ③    |             |     |     |     | ④      |                  |         |         |        |           | (注4)       |         |        |                  |                |     |         |       |  |  |
| 5種混合（DPT-IPV-Hib）                   |        | 不活化  |     |    | ①   | ②   | ③    |             |     |     |     | ④      |                  |         | 7.5歳まで  |        |           |            |         |        |                  |                |     |         |       |  |  |
| 3種混合（DPT）                           |        | 不活化  |     |    |     |     |      |             |     |     |     |        |                  |         |         |        | ①<br>(注5) |            |         |        | ② 11-12歳<br>(注6) |                |     |         |       |  |  |
| 2種混合（DT）                            |        | 不活化  |     |    |     |     |      |             |     |     |     |        |                  |         |         |        |           |            |         |        |                  | ① 11歳          | 12歳 |         |       |  |  |
| ポリオ（IPV）                            |        | 不活化  |     |    |     |     |      |             |     |     |     |        |                  |         |         |        | ①<br>(注7) |            |         |        |                  |                |     |         |       |  |  |
| インフルエンザ菌b型（ヒブ）<br>※アクトヒブ®で初回接種する場合  |        | 不活化  |     |    | ①   | ②   | ③    |             |     |     |     | ④      |                  |         |         | (注8)   |           |            |         |        |                  |                |     |         |       |  |  |
| 4種混合（DPT-IPV）<br>※4種混合ワクチンで初回接種する場合 |        | 不活化  |     |    | ①   | ②   | ③    |             |     |     |     | ④      |                  |         |         | 7.5歳まで |           |            |         |        |                  |                |     |         |       |  |  |
| BCG                                 |        | 生    |     |    |     |     |      |             | ①   |     |     |        |                  |         |         |        |           |            |         |        |                  |                |     |         |       |  |  |
| 麻疹・風疹混合（MR）                         |        | 生    |     |    |     |     |      |             |     |     |     | ①      |                  |         |         |        | ②<br>(注9) |            |         |        |                  |                |     |         |       |  |  |
| 水痘                                  |        | 生    |     |    |     |     |      |             |     |     |     | ①      |                  | ②       |         | (注10)  |           |            |         |        |                  |                |     |         |       |  |  |
| おたふくかぜ                              |        | 生    |     |    |     |     |      |             |     |     |     | ①      |                  |         |         |        |           | ②<br>(注11) |         |        |                  |                |     |         |       |  |  |
| 日本脳炎                                |        | 不活化  |     |    |     |     |      | 生後6か月から接種可能 |     |     |     |        |                  |         | ①<br>②  | ③      | 7.5歳まで    |            | ④ 9-12歳 |        |                  |                |     |         |       |  |  |
| インフルエンザ                             |        | 不活化  |     |    |     |     |      | 生後6か月から接種可能 |     |     |     |        | 毎年（10、11月などに）① ② |         |         |        |           |            |         | 13歳以上① |                  |                |     |         |       |  |  |
| 新型コロナウイルス                           |        | mRNA |     |    |     |     |      |             |     |     |     |        |                  |         |         |        |           |            |         |        |                  |                |     |         |       |  |  |
| ヒトパピローマウイルス（HPV）                    | 9価     | 不活化  |     |    |     |     |      |             |     |     |     |        |                  |         |         |        |           |            |         | (注12)  | 小6               | 中1① ②<br>(注13) |     | 中2～高1相当 | (注14) |  |  |
|                                     | 2価・4価  | 不活化  |     |    |     |     |      |             |     |     |     |        |                  |         |         |        |           |            |         | (注12)  | 小6               | 中1 ① ② ③ (注13) |     | 中2～高1相当 | (注14) |  |  |
| ワクチン                                |        | 種類   | 生直後 | 6週 | 2か月 | 3か月 | 4か月  | 5か月         | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9-11か月 | 12-15か月          | 16-17か月 | 18-23か月 | 2歳     | 3歳        | 4歳         | 5歳      | 6歳     | 7歳               | 8歳             | 9歳  | 10歳以上   |       |  |  |



定期接種の推奨期間



定期接種の接種可能な期間



任意接種の推奨期間



任意接種の接種可能な期間



添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間



健康保険での接種時期